

ЗАЩИТЕТЕ БЪДЕЩЕТО НА ВАШАТА РЕКОЛТА



ПРОПУЛС™



www.cropscience.bayer.bg

ПРОПУЛС™

||| АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Флуопирам – 125 г/л;
Протиоконазол - 125 г/л

||| ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспо-емулсия (СЕ)

||| КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II- ра професионална

||| КАРАНТИНЕН СРОК:
56 дни

||| МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Пропулс® 250 СЕ е фунгицид със системно действие. Флуопирам принадлежи към групата на SDHI фунгициди, протиоконазол е триазол от последно 3-то поколение.

||| ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ

- ||| Най-подвижният SDHI.
- ||| Комплексна защита от всички болести.
- ||| Изключителен контрол на склеротиния при рапица и слънчоглед.
- ||| Положителен ефект върху заздравяването на шушулките при рапица.
- ||| Положителен ефект върху масленото съдържание.

||| УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Срещу склеротиния третирането се извършва във фаза жълт бутон до начало на цъфтеж. Третирането да се извършва с наземна техника, позволяваща влизането в културата в подходящата фаза от развитието и.

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА
Рапица	Фомоза (<i>Phoma lingam</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Бели листни петна (<i>Pseudocercospora capsellae</i>), Алтернария (<i>Alternaria brassicae</i>), Брашнеста мана (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), Цилиндроспориоза (<i>Cylindrosporium spp.</i>)	100 мл/гка	10-30 л/гка	От фаза разтворен четвърти лист до фаза 30% от шушулките са оформени ВВСН 14-73 При спазване на закона за пчеларството	1	-
Слънчоглед	Черни петна (фомоза) (<i>Phoma macdonaldii</i>), Сиби петна (фомопсис) (<i>Phomopsis helianthii</i>), Склеротийно увяхване (склеротиния) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Алтернария (<i>Alternaria helianthi</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	80-100 мл/гка	15-40 л/гка	От фаза шести лист до фаза езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена ВВСН 16-59 При спазване на закона а пчеларството	2	14 дни
Царевица	Дребни листни петна (<i>Kabatella zaeae</i>), Северен листен призор (<i>Helminthosporium turcicum/ Exserohilum turcicum</i>), Южна петнистост (<i>Helminthosporium carbonum</i>)	80-100 мл/гка	20-40 л/гка	От фаза начало на угължаване на стъблото до фаза край на цъфтежа: косата е напълно суха ВВСН 30-69 При спазване на закона за пчеларството	2	14 дни
Слагка царевица	Северен листен призор (<i>Helminthosporium turcicum/ Exserohilum turcicum</i>)	100 мл/гка	10-40 л/гка	От фаза начало на угължаване на стъблото до фаза край на цъфтежа: косата е напълно суха ВВСН 30-69 При спазване на закона за пчеларството	2	14 дни

ЕФИКАСНОСТ НА ПРОПУЛС® СРЕЩУ БОЛЕСТИ ПО РАПИЦАТА


ДОЗА НА ДКА	ФОМА	БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА	СКЛЕРОТИНИЯ	БРАШНЕСТА МАНА	АЛТЕРНАРИЯ	ЦИЛИНДРОСПОРИОЗА
100 мл	++++	+++	++++	++++	++++	+++

ЕФИКАСНОСТ НА ПРОПУЛС® СРЕЩУ БОЛЕСТИ ПО СЛЪНЧОГЛЕД

ДОЗА НА ДКА	ЧЕРНИ ПЕТНА (ФОМОЗА)	СИВИ ПЕТНА (ФОМОПСИС)	СКЛЕРОТИЙНО УВЯХВАНЕ (СКЛЕРОТИНИЯ)	АЛТЕРНАРИЯ	СИВО ГНИЕНЕ
80-100 мл	++++	++++	++++	++++	+++

Ефикасност на Пропулс® срещу склеротиния и фома в рапица

Комплексна защита с Пропулс® в слънчоглед



ПРОПУЛС™



*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикетата.