АТЛАНТИС® ФЛЕКС

ДЕЙСТВИЕ НА АТЛАНТИС ФЛЕКС ВЪРХУ ШИРОКОЛИСТНИТЕ ПЛЕВЕЛИ

СТЕПЕН НА ЕФИКАСНОСТ НА АТЛАНТИС ФЛЕКС

при доза на прилагане – 33 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител)

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%:

Житни - Полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*), Обикновена ветрушка (*Apera spica-venti*), Див овес (*Avena fatua*), Южен овес (*Avena sterilis*), Полска овсига (*Bromus arvensis*), Многогодишен райграс (*Lolium perenne*), Обикновена метлица (*Poa trivialis*), Едногодишна метлица (*Poa annua*). Широколистни - Дива ряпа (*Raphanus raphanistrum*), Полски синап (*Sinapis arvensis*).

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85 % ДО 94 %:

Житни - Дългоосилеста овсига (*Bromus sterilis*), Италиански райграс (*Lolium multiflorum*), Твърда глушица (*Lolium rigidum*). Широколистни - Полско подрумче (*Anthemis arvensis*), Лъчисто колендро (*Bifora radians*), Лайка (*Matricaria chamomilla*), Врабчови чревца (*Stellaria media*)

АТЛАНТИС® ФЛЕКС

НЕПОКЛАТИМ КАТО СКАЛА

ПРЕДИМСТВА

- **Спектър на действие:** срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели
- **АТЛАНТИС ФЛЕКС** гарантира надежден контрол на изключително трудните за борба райграс и овсига
- Безопасен към културното растение благодарение на антидотната технология

Bayer

www.cropscience.bayer.bg

АТЛАНТИС® ФЛЕКС

НЕПОКЛАТИМ КАТО СКАЛА

НОВО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ЗА СТЛИЧЕН КОНТРОЛ НА ОВСИГА!

Bayer

www.cropscience.bayer.bg

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

АТЛАНТИС® ФЛЕКС

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Мезосулфурон-метил 45 г/кг,
Пропоксикарбазон-натрий 67,5 г/кг,
Мефенпир-диетил (антидот) 90 г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ:
Вододиспергируеми гранули (ВГ)

КАРАНТИНЕН СРОК:
не се изисква

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II-ра професионална

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Атлантис Флекс 20,25 ВГ

ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

// От фаза 3-ти лист до втори стъблен възел на културното растение.

// По-лесно се контролират плевели в начални фази от развитие 2-6 лист.

// Навременното третиране намалява конкуренцията от плевелната растителност и съхранява на максимум добивния потенциал на културата.

ДОЗИ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА	ДОЗА гр/дка	МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	ПРИЛЕПИТЕЛ мл/дка
Зимна пшеница	20 – 33 г/дка	От фаза три разтворени листа до фаза удължаване на стъблото – вторият възел е най-малко на 2 см над първия	100 мл/дка
Твърда пшеница	20 – 33 г/дка		100 мл/дка
Тритикале	20 – 33 г/дка		100 мл/дка

АТЛАНТИС® ФЛЕКС + biopower®

НАДЕЖДНО ДЕЙСТВИЕ НА ХЕРБИЦИДА ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИТЕ

ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ ВЛАСАТКА



Атлантис Флекс *контрола*

ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ РАЙГРАС



Атлантис Флекс *контрола*

Третираният райграс 35 дни по-късно трудно се намира в полето. Растенията са силно подтиснати и започват да изсъхват. Докато в контролата се наблюдава начало на братене на райграса със силно развит корен.

Унищожен напълно райграс, 25 дни след третиране

ЕФЕКТ ВЪРХУ СИНЯ МЕТЛИЧИНА ТРЕТИРАНА НА ЕСЕН

След 35 дни

Атлантис Флекс 25 г/дка *контрола*

След 92 дни

Атлантис Флекс 25 г/дка *контрола*