



АДЕНГО®»

НАДЕЖДНИЯТ ХЕРБИЦИД



Bayer

www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

Аденго - уникалният хербицид

Аденго предлага уникално ниво на гъвкавост при контрола на плевелите в царевица. Той осигурява безпрецедентна лекота при употреба, висока степен на сигурност и максимални резултати.

// Уникален широкоспектърен контрол през целия сезон върху повече от 85 вида житни и широколистни плевели, включително балур от семена

// Аденго притежава дълго реактивиращо се последствие, което повишава рентабилността на производство

Високоэффективно решение - съвременен хербицид и антидот-технология, комбинирани в уникален патентован продукт

Тиенкарбазон: последната иновация в групата на Сулфониуреите действа чрез потискане на синтеза на ензима ацетолактаза. Той контролира плевелите като блокира синтеза на аминокиселини с разклонена верига. Това води до незабавно спиране на растежа и прогресивно увреждане до пълно унищожаване на чувствителните плевели.

Изоксафлутол: този мощен патентован хербицид контролира плевелите, като блокира каротиноидния синтез и води до последваща загуба на хлорофил чрез фотооксидация, която се вижда като избелване.



Аденго - момент на ранновегетационно приложение



Аденго 40 мл/дка ранновегетационно (10 дни след третиране)



Аденго 10 дни след ранновегетационно приложение - общ план на полето



Аденго 40 мл/дка - почвено, 2 месеца след третиране

Аденго - удобство и надеждност чрез широк спектър



Аденго - удобство и надеждност чрез ГЪВКАВОСТ

Широко-спектърен контрол на ранното заплевеляване за чист старт на културата. Контрол върху плевелите през целия сезон

УНИКАЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА ОТ АДЕНГО:

- // Широкоспектърно действие на активните вещества
- // Мощно изгаряне на житните и широколистни плевели
- // Уникална синхронизирана технология за контрол над плевелите
- // Гъвкаво приложение за оптимизиране на работния процес

Аденго - ранновегетационно приложение

Ранновегетационно приложение
Категоричен ефект на **Аденго®** върху пелинолистна амброзия в доза 40 мл/дка



Контрола

Ранновегетационно приложение
Категоричен ефект на **Аденго®** върху прераснали широколистни плевели (бяла куча лобода, бутрак, къпина и др.) и едногодишни житни плевели (видовете кощрява, просо, див овес и др.) в доза 40 мл/дка



Ефект върху бяла куча лобода



Ефект върху къпина

Ранновегетационно приложение
Категоричен ефект на **Аденго**[®] върху балур от семена в доза 40 мл/дка



Ранновегетационно приложение
Категоричен ефект на **Аденго**[®] върху различни широколистни и житни плевели (лобода, синап, технологичен слънчоглед, кощрява и др.) в доза 40 мл/дка

