

За реколта от
най-висок КЛАС!

HUSSAR

ХУСАР®
Клас



www.cropscience.bayer.bg

ХУСАР

Клас

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Хусар® Клас е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите. Съдържа тиенкарбазон-метил от групата на триазиноните и йодосулфурон от групата на сулфониуреите.

Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата, спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Антиготът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения. **Хусар® Клас** контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

/// **КОНТРОЛ НА ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ КАТО РАЙГРАС, ДИВ ОВЕС, ВЕТРУШКА, ЛИСИЧА ОПАШКА**

/// **КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ, В ТОВА ЧИСЛО И ТРУДНИ ЗА КОНТРОЛ ЕФЕМЕРНИ ВИДОВЕ**

/// **ЦЕНОВО АТРАКТИВЕН**

/// **БЕЗОПАСЕН ЗА КУЛТУРАТА**

/// **УПОТРЕБА С ПРИЛЕПИТЕЛ МЕРО®**



РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА
Пшеница, ръж, тритикале, спелта	Широколистни и някои едногодишни житни плевели	20 - 30 г/га + 100 мл/га Метро®	15-30 л/га	От фаза начало на блатене: видим първи блат до фаза вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел ВВСН 21-32 При млади активно растящи плевели	1	-

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

При доза на прилагане – 30 г/га + Метро® 100 мл/га (прилепител)

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (*Apera spica-venti*). Широколистни - Подрумче (*Anthemis arvensis*), Самосевка ралица (*Brassica napus L.*), Овчарска торбичка (*Capsella bursa-pastoris*), Обикновена ралица (*Consolida regalis*), Лечебен росокас (*Fumaria officinalis*), Обикновена ленка (*Galium aparine*), Стъблообхватна мъртва коприва (*Lamium amplexicaule*), Червена мъртва коприва (*Lamium purpureum*), Лайка (*Matricaria chamomilla*), Полски мак (*Ranunculus acris*), Поветицовидно фасулке (*Polygonum convolvulus*), Врабчови чревца (*Stellaria media*).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Райграс (*Lolium spp.*), Див овес (*Avena fatua*). Широколистни – Синя метличина (*Centaurea cyanus*), Паламуга (*Cirsium arvense*), Брашлянолистно великденче (*Veronica hederifolia*), Персийско великденче (*Veronica persica*), Великденче (*Veronica spp.*), Полска теменуга (*Viola arvensis*).

При доза на прилагане – 20 г/га + Метро® 100 мл/га (прилепител)

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (*Apera spica-venti*). Широколистни - Подрумче (*Anthemis arvensis*), Самосевка ралица (*Brassica napus L.*), Овчарска торбичка (*Capsella bursa-pastoris*), Лечебен росокас (*Fumaria officinalis*), Стъблообхватна мъртва коприва (*Lamium amplexicaule*), Поветицовидно фасулке (*Polygonum convolvulus*), Врабчови чревца (*Stellaria media*).


Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Райграс (*Lolium spp.*), Див овес (*Avena fatua*). Широколистни – Синя метличина (*Centaurea cyanus*), Паламуга (*Cirsium arvense*), Обикновена ралица (*Consolida regalis*), Обикновена ленка (*Galium aparine*), Червена мъртва коприва (*Lamium purpureum*), Лайка (*Matricaria chamomilla*), Полски мак (*Ranunculus acris*), Брашлянолистно великденче (*Veronica hederifolia*), Персийско великденче (*Veronica persica*), Великденче (*Veronica spp.*), Полска теменуга (*Viola arvensis*).

 ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХУСАР® КЛАС

ХУСАР

Клас

 20 - 30 г/га




ХУСАР®
Клас




Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.




СИГУРЕН КОНТРОЛ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ



Райграс



Лисича опашка



Див овес



Ветрушка



СИГУРЕН КОНТРОЛ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

