

//////// МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТИЛМОР

Тилмор®
Фоликур®

100 мл/дка
50-100 мл/дка

Фаза 5-7 лист
на рапица

Тилмор®
100 мл/дка

Фаза зелен бутон
на рапица

ПРОПУЛС™ 100 мл/дка

Фаза цътеж при първи
окапали венчелистчета



//////// ЕФЕКТ ОТ НОВАТА ФОРМУЛАЦИЯ ВЪРХУ ОМОКРЯНЕТО НА ЛИСТАТА




Тилмор



КОНКУРЕНТЕН ПРОДУКТ

//////// ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ НА ТИЛМОР СРЕЩУ ФОМА


//////// ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ХАРМОНИЧНО,
ФИЗИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ,
което регулира растежа (от вегетативна маса към
корен) и съхранява растенията от различни фази
на развитие при неравномерно поникнал посев



ТРЕТИРАНЕ ПРИ 20% НАПАДЕНИЕ ОТ ФОМА
СПРЯНА ИНФЕКЦИЯ И ЛИПСА НА ПИКНИДИИ!



НЕТРЕТИРАНА КОНТРОЛА



Тилмор



ТИЛМОР®




Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

КЛЮЧЪТ
към *успеха*
в рапица

www.cropscience.bayer.bg

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ РАПИЦА



ПРОДУКТ Тилмор

Активни вещества: 80 г/л Протиоконазол
160 г/л Тебуконазол


Формулация: Емулсионен концентрат (240 ЕК)

Култура: Рапица

Употреба: 100 мл/дка; 2 приложения на сезон;
От фаза разтворен пети лист до фаза начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия ВВСН 15-30
От фаза видимо нарастване на трето междувъзлие до фаза „зелен бутон“ ВВСН 33-51

Регистрация: Сухо стъблено гниене – Фома

ПЕРФЕКТНО ПОКРИТИЕ НА ЛИСТАТА – НАБЛЮДАВАНО ПРИ UV СВЕТЛИНА




НЕТРЕТИРАНА КОНТРОЛА ТРЕТИРАНО ВЪВ ФАЗА 6-ТИ ЛИСТ

СЪЗДАВАНЕ НА ПЕРФЕКТНАТА РОЗЕТКА




нетретирано



Форма „ЕЛХИЧКА“

с малки и къси разклонения, които не се огряват от слънцето

Тилмор



Форма „ЧАДЪР“

долните разклонения достигат до нивото на централния цветонос

ФОМА – СУХО СТЬБЛЕНО ГНИЕНЕ, СРАВНЕНИЕ НА НЕТРЕТИРАНО С ТРЕТИРАНО С ТИЛМОР



сухо стъблено гниене сравнение на нетретирано и третирано с Тилмор ТИЛМОР НЕТРЕТИРАНО

ТИЛМОР – ОПТИМАЛНА КОМБИНАЦИЯ ЗА МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ

	Фома	Цилиндроспориоза	Алтернария	Склеротиния	Ботритис	Растежно-регулаторен ефект
Тебуконазол	+++	++++	+++	++	++	++++
Протиоконазол	++++	++	++++	++++	++++	+++